



Touring Club Italiano



Comune di Soave
Provincia di Verona



INFORMAZIONE SANITARIA ALLA POPOLAZIONE:

PRESENZA IN PROVINCIA DI VERONA DEL VIRUS WEST NILE DISEASE

Si informa che l'Azienda Ulss 9 Scaligera ha segnalato la presenza in provincia di Verona del virus West Nile Disease, trasmesso sia all'uomo che agli animali attraverso la puntura di zanzare infette.

L'infezione decorre nell'80% dei casi in modo del tutto asintomatico mentre nel 20% dei casi compare una malattia sistemica febbrile che si risolve in circa una settimana. In meno dell'1% dei casi la malattia si manifesta come malattia neuro-invasiva (encefalite, meningoencefalite), il rischio aumenta con età superiore a 60 anni.

Si raccomanda di adottare tutto quanto possibile al fine di evitare di essere punti dalle zanzare mediante l'adozione di sistemi idonei repellenti.


Il Comune sta procedendo nell'attività di disinfestazione delle aree pubbliche si confida nella collaborazione effettiva di tutti i privati evitando di creare situazioni che possano favorire lo sviluppo di zanzare quali: accumuli di acqua stagnante (es. sottovasi, secchi lasciati all'aperto in cui si accumula l'acqua, trattare le acque dei vari pozzetti grigliati,...).



IL VICE-SINDACO


Angelo Dalli Cani

...alleati per combattere le zanzare



Gli **INTERVENTI** del Comune ...

Il Comune di Soave svolge oramai da anni interventi di **controllo** sul territorio atti ad eliminare situazioni idonee al proliferarsi delle zanzare.




il controllo prevede:


- Informazione
- Consulenza al cittadino
- Monitoraggio larve e adulti
- Riduzione focolai larvali
- Trattamenti larvicidi (e adulticidi) con prodotti a basso impatto ambientale

...il **CONTRIBUTO** dei cittadini


LA LOTTA ALLE ZANZARE si attua prevalentemente in fase preventiva **IMPEDENDO LO SVILUPPO DELLE LARVE**: rimuovendo le potenziali raccolte d'acqua, od eventualmente, disinfestandole con prodotti a base di **BACILLUS THURINGIENSIS** varietà **ISRAELIENSIS** (reperibile in farmacia)



Svuotare almeno una volta alla settimana i contenitori di uso comune



Svuotare frequentemente o coprire con adeguati coperti (zanzariere) i recipienti usati per l'irrigazione e per gli animali



Nelle vasche ornamentali è consigliabile introdurre dei semplici vivai: peschi rossi









Monitorare caditoie e piscine in disuso ed eventualmente trattare con **B. THURINGIENSIS**



Svuotare o proteggere dall'acqua i copertoni, utilizzare vasi di fiori con interno in rame





Evitare situazioni in cui sia presente il ristagno di acqua



Le uova vengono deposte su raccolte d'acqua stagnante, o in prossimità.

LA LARVA ACQUATICA
Immersa anche in un velo di liquido, vive e si accresce nell'arco di pochi giorni.



LA PUPA
è la fase in cui il corpo della larva si trasforma in un insetto adulto

Con lo sfarfallamento nasce l'ADULTO di zanzara che tutti conosciamo. Solo le zanzare femmine sono dotate di bocca adatta a pungere: il sangue fornisce loro le sostanze necessarie alla maturazione delle uova.