


MICROZONAZIONE SISMICA

Carta delle microzone omogenee in prospettiva

Scala 1 : 8.000

Regione Veneto

Comune di San Pietro in Gu



Regione	Soggetto Realizzatore GEOSISTEMI YOUR GEOLOGICAL PARTNER Geol. Rimsky Valvassori Via dell'Oreficeria, 30/L 36100 VICENZA Collaboratori: Geol. Valentina Boccanegra Geol. Filippo Rocca Geol. Veronica Lobba Geol. Ivan Rizzi	Data: AGOSTO 2019
---------	---	-------------------

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- 2001

2001

Depositi fluvioglaciali grossolani (spessore tra 200 e 250 m), moderatamente addensate, con locale presenza di livelli sabbiosi. Possibili amplificazioni per effetti litostratigrafici.
- 2002

2002

Depositi fluvioglaciali a tessitura sabbiosa poco addensate (spessore tra 3 e 5 m) al di sopra di depositi fluvioglaciali grossolani (spessore tra 200 e 250 m), moderatamente addensate, con locale presenza di livelli sabbiosi. Possibili amplificazioni per effetti litostratigrafici.
- 2003

2003

Depositi fluvioglaciali a tessitura limo- argillosa poco consistenti (spessore tra 3 e 5 m) al di sopra di depositi fluvioglaciali grossolani (spessore tra 200 e 250 m), moderatamente addensate, con locale presenza di livelli sabbiosi. Possibili amplificazioni per effetti litostratigrafici.
- 2004

2004

Materiali di riporto eterogenei poco addensati (spessore tra 3 e 5 m) al di sopra di depositi fluvioglaciali grossolani (spessore tra 200 e 250 m), moderatamente addensate, con locale presenza di livelli sabbiosi. Possibili amplificazioni per effetti litostratigrafici.
- 2005

2005

Depositi fluvioglaciali grossolani (spessore > 250 m), moderatamente addensate, con locale presenza di livelli sabbiosi. Possibili amplificazioni per effetti litostratigrafici.
- 2006

2006

Depositi fluvioglaciali a tessitura sabbiosa poco addensate (spessore tra 3 e 5 m) al di sopra di depositi fluvioglaciali grossolani (spessore > 250 m), moderatamente addensate, con locale presenza di livelli sabbiosi. Possibili amplificazioni per effetti litostratigrafici.
- 2007

2007

Depositi fluvioglaciali a tessitura limo- argillosa poco consistenti (spessore tra 3 e 5 m) al di sopra di depositi fluvioglaciali grossolani (spessore > 250 m), moderatamente addensate, con locale presenza di livelli sabbiosi. Possibili amplificazioni per effetti litostratigrafici.
- 2008

2008

Materiali di riporto eterogenei poco addensati (spessore tra 3 e 5 m) al di sopra di depositi fluvioglaciali grossolani (spessore > 250 m), moderatamente addensate, con locale presenza di livelli sabbiosi. Possibili amplificazioni per effetti litostratigrafici.

Zone di attenzione per instabilità

- ZALQ – Zona di attenzione per liquefazione – Zona 1
- ZALQ – Zona di attenzione per liquefazione – Zona 2
- ZALQ – Zona di attenzione per liquefazione – Zona 3
- ZALQ – Zona di attenzione per liquefazione – Zona 4
- ZALQ – Zona di attenzione per liquefazione – Zona 5
- ZALQ – Zona di attenzione per liquefazione – Zona 6
- ZALQ – Zona di attenzione per liquefazione – Zona 7
- ZALQ – Zona di attenzione per liquefazione – Zona 8

Forme sepolte e di superficie

Asse di paleovalve

Punti di misura di rumore ambientale

 Punto di misura di rumore ambientale con indicazione del valore di f0

